



Trypsininhibitor reduzierte Sorte

- Saustark in der direkt Verfütterung
- Direkte Fütterung ohne Toasten
- Dunkler Nabel und mittelgroßes Korn

Sorteneigenschaften:

Reifegruppe:	OO
Sortentyp:	mittleres Verzweigungspotential
Nutzung:	direkt Verfütterung
Blütenfarbe:	violett
Nabelfarbe:	dunkel braun

Agronomische Eigenschaften*:

Jugendentwicklung:	7 mittel
Reife:	7 späte OO
Wuchshöhe:	7 lang
Standfestigkeit:	4 gut
1000 Korngewicht	7 hoch
Kornausfall:	3 gut
Peronospora:	4 mittel
Sclerotinia:	3 gut
Bakteriosen:	3 gut
Virusbefall:	4 mittel

* ... Züchtereinstufung



Ertragspotenzial:

Ertragspotential:	hoch
Proteingehalt:	~40,2% in TS*
Ölgehalt:	~21,9% in TS*

Kulturführung:

Aussaat Zeit:	ab Mitte April (10°C Bodentemperatur)
Aussaat Menge:	55 Körner/m ² = 3,5 Pck./ha
Aussaat Technik:	Drillsaat / Einzelkorn – Reihen auch bis 75cm
Düngung:	Leguminose, keine N-Düngung
Düngung:	65kg/P ₂ O und 90kg/K ₂ O
Impfung:	mit Rhizobien vorinokuliertes Saatgut verfügbar

Sortenbeschreibung: XONIA deckt mit ihren extrem großen Blättern den Boden rasch ab und kann im Stall direkt (ohne Toasten) Verfüttert werden. Einfach saustark am Feld und im Stall !